Plan de Gestion des dragages des ports du Morbihan

Document de travail

Fiches de synthèse

Base de données S.I.G

GMGL Janvier 2012

www.univ-ubs.fr/gmgl

Table des matières

- Les ports du Morbihan: localisation et contexte littoral
- Composition des vases: Structure physico-chimique, origine et toxicité des éléments polluants
- Les sédiments fins: milieux d'échanges favorisant une bioaccumulation
- Les techniques de dragage et de mise en dépôt
- Immersion des sédiments: seuils GEODE pour les métaux lourds, HAP, TBT et PCB.
Dépôt à terre: test de lixiviation
- Valeurs normatives pour les métaux lourds en France, Canada, Italie, Portugal et Pays-Bas.
- Métaux lourds : exemple de la France pour l'Atlantique, la Manche et la Méditerranée:
valeurs minimales et maximales des médianes annuelles des concentrations en contaminants
- Métaux lourds : exemple de la baie de Quiberon et du Golfe du Morbihan:
 - Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2009
 - Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2010
 - Mise en parallèle avec les données de port Haliguen et du port du Crouesty

GÉOSCIENCES MARINES
GÉOMORPHOLOGIE DU LITTORAL
UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD
G.M.L.C.O.-E.M.E. 66316.E.W.

Les ports du Morbihan: localisation et contexte littoral

Localisation des principaux ports du Morbihan

GÉOSCIENCES MARINES
GÉOMORPHOLOGIE DU LITTORAL
UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD
G.M.L.C.O.-I.M.E. 66316.E.W.

Les ports du Morbihan et les zones protégées

Volume de sédiments dragués de 1994 à 2009 (DDTM 2010)

GÉOSCIENCES MARINES
GÉOMORPHOLOGIE DU LITTORAL
UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD
G.M.L.C.O.-I.M.E. 66316.E.W.

Estimation des besoins de dragage d'ici à 2019 (DDTM 2010)

Localisation des sites de clapage et volumes clapés (DDTM 2010)

Le Golfe du Morbihan et la baie de Quiberon

GÉOSCIENCES MARINES
GÉOMORPHOLOGIE DU LITTORAL
UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD
G.M.L.C.O.-I.M.E. 66316.E.W.

Le Golfe du Morbihan et la baie de Quiberon : bathymétrie

Le Golfe du Morbihan et la baie de Quiberon : nature des fonds superficiels (SHOM 2009)

Le Golfe du Morbihan et la baie de Quiberon : taille des principaux ports gérés par la SAGEMOR

Le Golfe du Morbihan et la baie de Quiberon : localisation du site de clapage des sédiments et contexte environnemental

Le Golfe du Morbihan et la baie de Quiberon : délimitation des bassins versants et du réseau hydrographique

GÉOSCIENCES MARINES
GÉOMORPHOLOGIE DU LITTORAL
UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD
G.M.L.C.O.-I.M.E. 66316.E.W.

Le Golfe du Morbihan et la baie de Quiberon : carte géologique Terre-Mer et bassins versants (THINON et Al., 2009)

Le Golfe du Morbihan et la baie de Quiberon : légende de la carte géologique Terre-Mer (THINON et Al., 2009)

Légende		A Terre	En Mer	D'après la carte géologique de Lorient 1/250000 BRGM, Thinon et al., 2009 Projection Lambert II étendu
Cénozoïque				
Quaternaire		Dépôts superficiels (alluvions, dunes)		
Mio-Pliocène		Sables, argiles, graviers		
Eocène-Oligocène		Grès, sables, argiles, marnes, calcaires		Calcaires à nummulites
Paléozoïque				
Carbonifère		Granite de Questembert: Leucogranites		Granite de Questembert: Leucogranites
		Granite de Carnac: Leucogranites, monzogranites		
Ordovicien-Silurien		Grès, schistes, quartzites, misaschistes		
Ordovicien		Unité de Lanvaux: Métagranites, orthogneiss		
		Unité de la Vilaine: Micaschistes, paragneiss, amphibolites		Unité de la Vilaine: Micaschistes, paragneiss, amphibolites
		Orthogneiss granitiques		
Cambro-Ordovicien				Unité de Groix-Céné: Micaschistes, glauconphanites
Néoprotérozoïque-Ordovicien		Unité de Lanvaux: Schistes, grès feldspathiques		
		Unité de Péaule: Quartzites, schistes, micascistes		
		Unité du Pouldu: Amphibolites, schistes verts, micaschistes		
Néoprotérozoïque		Unité du Morbihan: Paragneiss, morbihannites, migmatites		Unité du Morbihan: Paragneiss, morbihannites, migmatites
Non différencié		Ultramytonites		Faille
		Quartz		Faille de détachement supposée
				Chevauchement supposé

Le Golfe du Morbihan et la baie de Quiberon : géologie des différents bassins versants (THINON et Al., 2009)

COMPOSITION DES VASES:

Structure physico-chimique,
origine et toxicité des éléments polluants

Schéma de la composition de sédiments portuaires (IDRA 2006)

Représentation schématique de la composition de sédiments portuaires en place soit:

- 70 à 80% d'eau --> 1 m³ de sédiments = 700 L d'eau
- 20 à 30 % de matières sèches
- Essentiel de la pollution fixée sur les particules
- Densité moyenne entre 1.2 et 1.3 --> 1 m³ de sédiments = 1200 à 1300 kg

Origine des matières en suspension de l'estuaire

Les principaux contaminants des sédiments de dragage (GREGOIRE P., 2004)

Origine et toxicité des éléments polluants (IDRA 2006)

CONTAMINANT	SOURCE	TOXICITE
CONTAMINANTS METALLIQUES		
Arsenic (As)	Combustion du charbon, émissions atmosphériques industrielles	Accumulé par les micro-algues, poissons, mollusques. Toxicité sur consommateur humain non définie
Cadmium (Cd)	Emissions atmosphériques par activités métallurgiques et incinération des déchets	Bio-accumulation dans la chaîne alimentaire. Toxique pour le consommateur humain
Chrome (Cr)	Industries métallurgiques ou chimiques. Véhiculé par les fleuves	Anomalie du développement larvaire des bivalves
Cuivre (Cu)	Industries électriques, véhiculé par les fleuves. Matière active des peintures marines antisalissures (Cu ₂ O)	Inhibition de croissance du phytoplancton
Mercure (Hg)	Incinération du charbon / des déchets. Traitement des minerais non ferreux. Piles et batteries	Forte bio-accumulation et danger pour le consommateur humain
Nickel (Ni)	Combustion d'énergies fossiles. Production de métaux non ferreux	Anomalies de développement larvaire
Plomb (Pb)	Carburants. Combustion de déchets	Bio-accumulation. Anomalies de développement des bivalves
Zinc (Zn)	Peintures anticorrosion / Industries métallurgiques. Combustion du charbon et du bois	Toxicité relative
CONTAMINANTS ORGANIQUES		
Polychlorobiphényles (PCB)	Transformateurs électriques, peintures, encres, apprêts	Bio-accumulés. Effets cancérigènes
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)	Combustion de charbon et pétroles. Pertes lors du transport de ces matières	Effets cancérigène et mutagène
Le Tributylétain (TBT)	Re-largué par les peintures antisalissure des navires de 25m, interdite pour les navires <25m (remplacés par des peintures au Cu)	Très toxiques pour les mollusques (stérilisation des femelles) à des concentrations faibles. Imposex au-delà de 1 ng/L et anomalies de la calcification de l'huître creuse au-delà de 2ng/L

Distribution des contaminants en fonction de la taille des grains: exemple du cadmium (GREGOIRE P., 2004)

GÉOSCIENCES MARINES
GÉOMORPHOLOGIE DU LITTORAL
UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD
G.M.L.C.O.-E.M.E. 66316.E.W.

Les sédiments fins: milieux d'échanges favorisant une bioaccumulation

Niveaux de contamination PCB et HAP dans les réseaux trophiques du bar et du flet (ng/g) (GREGOIRE P., 2004)

Bioaccumulation (PCB-CB153) et biotransformation (HAP) (GREGOIRE P., 2004)

GÉOSCIENCES MARINES
GÉOMORPHOLOGIE DU LITTORAL
UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD
G.M.L.C.O.-E.M.E. 66316.E.W.

Les techniques de dragage et de mise en dépôt

Les techniques de dragage: dragues mécaniques (GREGOIRE P., 2004)

Les techniques de dragage: dragues hydrauliques (GREGOIRE P., 2004)

Les techniques de mise en dépôt (GREGOIRE P., 2004)

Définition des types de dépôts (GREGOIRE P., 2004)

	Type 1	Type 2	Type 3	Type 4	Type 5	Type 6	Type 7	Type 8	Type 9
Caractéristiques du site	Dépression artificielle du fond marin	Dépression naturelle du fond marin	Tumulus sur le fond marin	Digues subaquatiques	Atolls artificiels	Île / péninsule artificielles	Lac intérieur, rivière ou autre eau ouverte	Lac intérieur ou autre eau ouverte	Site terrestre
Type de dépôt	Dépôt aquatique	Dépôt aquatique	Dépôt aquatique	Dépôt aquatique	Digue: dépôt aquatique ; remblai: dépôt confiné	Digue: dépôt aquatique ; remblai: dépôt confiné	Dépôt aquatique	Dépôt aquatique	Dépôt terrestre
Type de retenue	Retenue latérale			Retenue latérale	Dépôt confiné	Dépôt confiné	Dépôt confiné	Dépôt confiné	Dépôt confiné
Avec recouvrement	Dépôt aquatique retenu	Dépôt aquatique retenu	Recouvrement sur fond nivelé	Dépôt aquatique contenu					
Potentiel du site						Valorisation		Valorisation	Valorisation
Remarques							Les types de dépôts 1 à 5 existent dans le cadre du type 7		

Organigramme schématiques de modélisation mathématique pour le calcul de transport de sédiments (Borst W., 2000)

Evaluation des effets potentiels du processus de dragage sur l'environnement (GREGOIRE P., 2004)

Cadre d'évaluation des matériaux de dragage (AIPCN, 1998)

Immersion des sédiments: seuils GEODE pour les métaux lourds, HAP, TBT et PCB

Dépôt à terre: test de lixiviation

Immersion des sédiments: seuil GEODE (France) pour les métaux lourds et pour le TBT

(ppm = mg/kg)

Immersion des sédiments: seuil GEODE (France) pour les HAP

(ppm = mg/kg)

Immersion des sédiments: seuil GEODE (France) pour les PCB

(ppm = mg/kg)

Dépôt à terre: test de lixiviation

test lixiviation		Critères d'admission de déchets dans les décharges					
Caractéristiques Physiques		ISDI	seuil	ISDND	seuil	ISDD	
Matière sèche	% prod brut	Installation de Stockage de Déchets Inertes	30	Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux	30	Installation de Stockage de Déchets Dangereux	30
COT sur bruts	mg/kg sec		30000		50000		100000
COT sur éluat	mg/kg sec		500		800		1000
Fraction soluble sur éluat	mg/kg sec		4000		60000		100000
Chlorures syr éluat	mg/kg sec		800		15000		25000
Fluorures sur éluat	mg/kg sec		10		150		500
Sulfates sur éluat	mg/kg sec		1000		20000		50000
Indices phénols sur éluat	mg/kg sec		1		3		1000
Antimoine	mg/kg sec		0,06		0,7		5
Arsenic	mg/kg sec		0,5		2		25
Baryum	mg/kg sec		20		100		300
Cadmium	mg/kg sec		0,04		1		5
Chrome	mg/kg sec		0,5		10		70
Cuivre	mg/kg sec		2		50		100
Mercure	mg/kg sec		0,01		0,2		2
Molybdène	mg/kg sec		0,5		10		30
Nickel	mg/kg sec		0,4		10		40
Plomb	mg/kg sec		0,5		10		50
Sélénium	mg/kg sec		0,1		0,5		7
Zinc	mg/kg sec		4		50		200
Some des PCB	µg/kg sec	1000	/	/			
Somme de BTEX	mg/kg sec	6	/	/			
Somme des 16 HAP	mg/kg sec	50	/	/			
Indices hydrocarbures C10 à C40	mg/kg sec	500	2500	50000

GÉOSCIENCES MARINES
GÉOMORPHOLOGIE DU LITTORAL
UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD
G.M.L.C.O.-E.M.E. 66311E.W.

Valeurs normatives pour les métaux lourds en France, Canada, Italie, Portugal et Pays-Bas.

Utilisation des valeurs normatives pour la mise en dépôt (GREGOIRE P., 2004)

Pays	Classes Niveaux Seuils	Orientations décisionnelles
Pays -Bas	Classe 0	Aucune restriction
	Classe 1	Rejet en mer
	Classe 2	Rejet en mer possible
	Classe 3	Dépôt à terre si possible
	Classe 4	Dépôt à terre impératif
France	Niveau 1	Valeurs < Niv 1, immersion autorisée
		Entre Niv1 et Niv2, études complémentaires
	Niveau 2	Valeurs > Niv2, études approfondies
Portugal	Classe 0	Aucune restriction
	Classe 1	Précautions avant rejet en mer
	Classe 2	Etudes approfondies avant rejet en mer
	Classe 3	Dépôt cellule étanche, couche imperméable
	Classe 4	Immersion, stockage à terre interdits
Italie	Niveau A	Valeurs < Niv A, confinement léger
	Niveau B	Entre Niv A et Niv B, confinement permanent avec feuille plastique
	Niveau C	Entre Niv B et Niv C, confinement permanent lourd avec fondation profonde continue
Canada	SSE	seuil sans effet
	Niveau 1	Niv < SEM, rejet en eau libre sans restriction
	SEM	seuil d'effets mineurs
	Niveau 2	Entre SEM et SEN, examen environnemental attentif
	SEN	seuil d'effets néfastes
	Niveau 3	Niv > SEN, traitement, confinement, réduction de sources, restauration du milieu

Critères de qualité pour les 5 pays concernant l'arsenic (GREGOIRE P., 2004)

ppm = mg/kg

Critères de qualité pour les 5 pays concernant le cadmium (GREGOIRE P., 2004)

ppm = mg/kg

Critères de qualité pour les 5 pays concernant le chrome (GREGOIRE P., 2004)

ppm = mg/kg

Critères de qualité pour les 5 pays concernant le cuivre (GREGOIRE P., 2004)

ppm = mg/kg

Critères de qualité pour les 5 pays concernant le mercure (GREGOIRE P., 2004)

ppm = mg/kg

Critères de qualité pour les 5 pays concernant le nickel (GREGOIRE P., 2004)

ppm = mg/kg

Critères de qualité pour les 5 pays concernant le plomb (GREGOIRE P., 2004)

ppm = mg/kg

Critères de qualité pour les 5 pays concernant le zinc (GREGOIRE P., 2004)

ppm = mg/kg

Métaux lourds : exemple de la France pour l'atlantique, la manche et la méditerranée.

Valeurs minimales et maximales des médianes annuelles
des concentrations en contaminants

Valeurs minimales et maximales des concentrations en arsenic (ALZIEU et Al., 1999)

ppm = mg/kg

Valeurs minimales et maximales des concentrations en cadmium (ALZIEU et Al., 1999)

ppm = mg/kg

Valeurs minimales et maximales des concentrations en chrome (ALZIEU et Al., 1999)

ppm = mg/kg

Valeurs minimales et maximales des concentrations en cuivre (ALZIEU et Al., 1999)

ppm = mg/kg

Valeurs minimales et maximales des concentrations en mercure (ALZIEU et Al., 1999)

ppm = mg/kg

Valeurs minimales et maximales des concentrations en nickel (ALZIEU et Al., 1999)

ppm = mg/kg

Valeurs minimales et maximales des concentrations en plomb (ALZIEU et Al., 1999)

ppm = mg/kg

Valeurs minimales et maximales des concentrations en zinc (ALZIEU et Al., 1999)

ppm = mg/kg

Métaux lourds : exemple de la baie de Quiberon et du Golfe du Morbihan.

Résumé des données pour le Morbihan

Les besoins de dragage des ports dans leur contexte littoral en Morbihan (GMGL – DDTM 2010)

Métaux lourds : exemple de la baie de Quiberon et du Golfe du Morbihan:

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds
par rapport au seuil GEODE pour 2009
(ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2009 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010)

As

(ppm = mg/kg)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2009 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010)

Cd

(ppm = mg/kg)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2009 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010)

Cr

(ppm = mg/kg)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2009 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010)

Cu

(ppm = mg/kg)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2009 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010)

Hg

(ppm = mg/kg)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2009 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010)

Pb

(ppm = mg/kg)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2009 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010)

Zn

(ppm = mg/kg)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE, résumé des données 2009 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010)

(ppm = mg/kg)

GÉOSCIENCES MARINES
GÉOMORPHOLOGIE DU LITTORAL
UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD
G.M.L.C.O.-I.M.E. 66316.F.W.

Métaux lourds : exemple de la baie de Quiberon et du Golfe du Morbihan:

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds
par rapport au seuil GEODE pour 2010
(ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2010 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010)

As

(ppm = mg/kg)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2010 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010)

Cd

(ppm = mg/kg)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2010 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010)

Cr

(ppm = mg/kg)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2010 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010)

Cu

(ppm = mg/kg)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2010 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010)

Hg

(ppm = mg/kg)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2010 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010)

Pb

(ppm = mg/kg)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2010 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010)

Zn

(ppm = mg/kg)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE, résumé des données 2010 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010)

Métaux lourds : exemple de la baie de Quiberon et du Golfe du Morbihan:

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2010, mise en parallèle avec les données de port Haliguen et du port du Crouesty

(ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010 – In Vivo 2011)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2010 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010 – In Vivo 2011)

As

(ppm = mg/kg)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2010 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010 – In Vivo 2011)

Cd

(ppm = mg/kg)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2010 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010 – In Vivo 2011)

Cr

(ppm = mg/kg)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2010 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010 – In Vivo 2011)

Cu

(ppm = mg/kg)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2010 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010 – In Vivo 2011)

Hg

(ppm = mg/kg)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2010 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010 – In Vivo 2011)

Pb

(ppm = mg/kg)

Cartographie et représentation des teneurs en métaux lourds par rapport au seuil GEODE pour 2010 (ONG M.C., 2011 – In Vivo 2010 – In Vivo 2011)

Zn

(ppm = mg/kg)